

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
“DR. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ”
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
SANTA CLARA, VILLA CLARA

III JORNADA NACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA GENERAL INTEGRAL, II ENCUENTRO
HISPANO LUSO AMERICANO DE ESTOMATOLOGÍA Y EL II ENCUENTRO HISPANO LUSO
AMERICANO DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

MANIFESTACIONES BUCOFACIALES EN PACIENTES
CON RETINOSIS PIGMENTARIA

MODALIDAD: TEMA LIBRE

Por:

MSc. Dra. Araelis R. Ruiz Hernández¹, Dr. Wilian Portal Fernández², Dr. Jorge Fernández García³,
MSc. Dra. Geysa M. Choy Martínez⁴ y Dr. Raúl Rivera Truy⁵

1. Especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial y de II Grado en Estomatología General Integral, Máster en Salud Pública. Profesora Auxiliar. Facultad de Estomatología. UCM-VC. e-mail: araelisrh@iscm.vcl.sld.cu
2. Especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial. Instructor. Facultad de Estomatología. UCM-VC.
3. Especialista de II Grado en Farmacología y Alergia. Profesor Auxiliar. Facultad de Estomatología. UCM-VC. e-mail: jorgefg@iscm.vcl.sld.cu
4. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Instructor. Máster en Salud Pública. Facultad de Estomatología. UCM-VC. e-mail: geysachoy@gmail.com
5. Especialista de I Grado en Cirugía Maxilofacial. Instructor. Facultad de Estomatología. UCM-VC. e-mail: Raulr2766@yahoo.es

Resumen

Introducción: La retinosis pigmentaria es una rara enfermedad ocular, de carácter progresivo y hereditario; su marcha crónica y progresiva conduce al deterioro de la visión periférica y luego central. En nuestro país, se han realizado grandes esfuerzos dirigidos a precisar la causa y formas de tratamiento de la enfermedad. **Objetivos:** Determinar la coexistencia de alteraciones bucofaciales en pacientes afectados por retinosis pigmentaria, caracterizar anatómo descriptivamente las variaciones presentes en la bucofaringe y las regiones adyacentes, así como evidenciar la presencia de alteraciones bucofaciales medibles o cuantificables en estos pacientes. **Métodos:** La investigación es considerada un estudio prospectivo no experimental, y se realizó en el Centro de Retinosis Pigmentaria desde 1997 hasta la fecha. La muestra estuvo constituida por 163 pacientes con diagnóstico de retinosis pigmentaria que coincidentemente fueron admitidos en esta fecha en el grupo, e igual número para el grupo control. Se les practicó un interrogatorio y examen físico intra- y extrabucal. Se aplicaron el análisis discriminante, la regresión logística y la técnica de segmentación de CHAID, complementadas con tablas de contingencia que ayudaron a evaluar los resultados. **Resultados:** Se pudo realizar una buena clasificación extra- e intrabucal;

aparecieron con mayor frecuencia alteraciones del tercio superior, lengua de pájaro, presencia de hipertelorismo y paladar rectangular. Los pacientes con la variante típica de la retinosis pigmentaria presentaron un mayor número de alteraciones. **Recomendaciones:** Profundizar en el estudio, marcar el componente genético y hacerlo extensivo a los demás centros de estudio de dichas enfermedades.

Descriptor deCS:

RETINITIS PIGMENTOSA
BOCA/LESIONES

Subject headings:

RETINITIS PIGMENTOSA
MOUTH/INJURIES