

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
“DR. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ”
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
SANTA CLARA, VILLA CLARA

III JORNADA NACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA GENERAL INTEGRAL, II ENCUENTRO
HISPANO LUSO AMERICANO DE ESTOMATOLOGÍA Y EL II ENCUENTRO HISPANO LUSO
AMERICANO DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

LESIONES DE LA MUCOSA BUCAL Y ALGUNOS FACTORES DE
RIESGO EN LA POBLACIÓN ADULTA DEL ÁREA DE SALUD
DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO “MARTA ABREU”. 2008

Por:

Dra. Belkis García Cárdenas¹ y Dra. Gladys M. Rodríguez Alonso²

1. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Facultad de Estomatología Instructora UCM-VC.
2. Especialista de I Grado en Estomatología General Integral. Máster en Urgencias Estomatológicas. Facultad de Estomatología. Instructora. UCM-VC.

Resumen

A pesar de las estrategias y programas contra el cáncer bucal, sigue en ascenso el número de incapacidades y muertes que provoca. Con el objetivo de describir el comportamiento de las lesiones de la cavidad bucal, detectadas en la población, que fue remitida a consulta de Cirugía Máxilo-Facial del Policlínico Docente “Marta Abreu” de Santa Clara durante el año 2008, se realizó un estudio descriptivo transversal sobre aquellas lesiones detectadas, y se seleccionó una muestra representativa de 84 pacientes; de aquellos que tenían un diagnóstico confirmado por biopsia y estudio histopatológico de la lesión, se relacionaron algunos factores de riesgo que se asocian a la aparición de daños a la mucosa bucal. Se les aplicó una encuesta para evaluar los conocimientos que tenían sobre cáncer y otras lesiones bucales, así como la vía por la que los adquirieron. Predominó el sexo femenino, el grupo de 61 a 70 años, con un nivel de escolaridad de preuniversitario y secundaria terminada, y la ocupación de jubilados y amas de casa. Se observó que las lesiones más frecuentes fueron: la leucoplasia, el hemangioma y el épolus fisurado; se relacionaron en mayor grado con los factores de riesgo que constituyen el hábito de fumar y la higiene bucal deficiente. Como sitios preferenciales, resultaron la mucosa del carrillo, labio inferior, labio superior y la parte media de la lengua; los tres primeros fueron los subsitios donde apareció la leucoplasia como lesión más recurrente. El nivel de conocimientos fue regular y, en su mayoría, los adquirieron del estomatólogo.

Descriptor DeCS:

MUCOSA BUCAL/lesiones
FACTORES DE RIESGO
LEUCOPLAQUIA BUCAL

Subject headings:

MOUTH MUCOSA/injuries
RISK FACTORS
LEUKOPLAKIA, ORAL