

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS  
"DR. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ"  
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA  
SANTA CLARA. VILLA CLARA

III JORNADA NACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA GENERAL INTEGRAL, II ENCUENTRO  
HISPANO LUSO AMERICANO DE ESTOMATOLOGÍA Y EL II ENCUENTRO HISPANO LUSO  
AMERICANO DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  
CRÓNICA EN LA POBLACIÓN ADULTA

MODALIDAD: CARTEL

Por:

MSc. Dra. Ivonne González Rojo<sup>1</sup>, MSc. Dra. Bárbara Toledo Pimentel<sup>2</sup> y Dra. Imelda Gutiérrez Álvarez<sup>3</sup>

1. Especialista I Grado en Estomatología General Integral. Máster en Salud Bucal Comunitaria.
2. Especialista II Grado en Periodoncia. Máster en Salud Bucal Comunitaria. Profesora Auxiliar. UCM-VC.
3. Especialista I Grado en Periodoncia. Instructora. UCM-VC.

**Resumen**

**Objetivo:** Determinar la posible asociación entre los factores de riesgo y la enfermedad periodontal inflamatoria crónica en la población examinada. **Diseño metodológico:** Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo transversal en una población entre 18 y 59 años de las distintas unidades pertenecientes al hospital "Manuel Fajardo Rivero" de Santa Clara. Se examinaron en visitas realizadas en el terreno 715 pacientes en el período de un año: de junio del 2007 a junio del año 2008. **Resultados:** Se aplicaron cuestionarios para determinar la presencia o no de enfermedad periodontal inflamatoria crónica y los factores de riesgo asociados. La prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal se determinó mediante el Índice Periodontal de Russell en su forma revisada y la higiene bucal se midió con el Índice de Higiene Bucal Revisado. Se obtuvo una prevalencia de enfermedad periodontal de un 45,1 %, y los factores de riesgo con mayor asociación a la enfermedad periodontal fueron la higiene bucal deficiente, los dientes ausentes sin reemplazo, el hábito de fumar, la diabetes mellitus, el estrés y la caries dental. **Conclusiones:** Entre los pacientes examinados, el grupo de edad más numeroso fue el de 35-59 años; predominó el sexo masculino sobre el femenino en todos los grupos de edades. Se encontró una mayor prevalencia de pacientes sanos con relación a los enfermos periodontales. Entre los que presentaron la enfermedad, predominó la gingivitis. La higiene bucal deficiente, el hábito de fumar y el estrés fueron, dentro de los factores de riesgo estudiados, los que guardaron relación con la enfermedad periodontal.

**Descriptor DeCS:**  
ENFERMEDADES  
PERIODONTALES/epidemiología  
FACTORES DE RIESGO

**Subject headings:**  
PERIODONTAL DISEASES/epidemiology  
RISK FACTORS