

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS
“DR. SERAFÍN RUIZ DE ZÁRATE RUIZ”
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
SANTA CLARA, VILLA CLARA

III JORNADA NACIONAL DE ESTOMATOLOGÍA GENERAL INTEGRAL, II ENCUENTRO
HISPANO LUSO AMERICANO DE ESTOMATOLOGÍA Y EL II ENCUENTRO HISPANO LUSO
AMERICANO DE MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

ESTIMACIÓN DEL FLUJO SALIVAL EN PACIENTES MAYORES DE 15 AÑOS

MODALIDAD: TEMA LIBRE

Por:

MSc. Dra. Lilian Toledo Reyes¹, MSc. Dra. Leticia Espinosa González², MSc. Dra. Sara Fé de la Mella Quintero³ y MSc. Dra. Isabel Ramos Hurtado⁴

1. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Salud Bucal Comunitaria. Asistente. UCM-VC. e-mail: liliantr@ucm.vcl.sld.cu
2. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Atención de Urgencias Estomatológicas. Profesora Auxiliar. UCM-VC. e-mail: leticiaeg@ucm.vcl.sld.cu
3. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Salud Bucal Comunitaria. Instructora. UCM-VC. e-mail: sarahm@ucm.vcl.sld.cu
4. Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Salud Bucal Comunitaria. Profesora Titular y Consultante. e-mail: isabelrh@ucm.vcl.sld.cu

Resumen

Se realizó un estudio descriptivo transversal para identificar signos y síntomas frecuentes en personas con escaso flujo salival. El universo de trabajo estuvo constituido por 34 pacientes mayores de 15 años, atendidos en la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas “Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz” de Villa Clara, examinados de septiembre a marzo de 2007. La recogida de la información se realizó mediante encuestas, exámenes clínicos, observación y mediciones. La estimación del flujo salival se obtuvo por recolección de saliva estimulada. Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó: análisis porcentual, media aritmética, desviación estándar y prueba de inferencia. Se determinó que el mayor número de pacientes con escaso flujo salival eran adultos mayores. Se obtuvo como resultado notorio la presencia de caries dental como la enfermedad más frecuente entre las personas con flujo salival escaso, y la sequedad de la mucosa bucal como signo clínico de mayor predominio.

Descriptor DeCS:
SALIVA
XEROSTOMIA
SALUD BUCAL

Subject headings:
SALIVA
XEROSTOMÍA
ORAL HEALTH