

**HOSPITAL UNIVERSITARIO
"ARNALDO MILIÁN CASTRO"
SANTA CLARA, VILLA CLARA**

**SATISFACCIÓN EN LA REHABILITACIÓN CON SOBREDENTADURAS
IMPLANTORRETENIDAS MUCOSOPORTADAS**

Por:

Dra. María Gabriela Pérez Cuevas¹, Dra. Jadiyah Mohamed Embarek², MSc. Dra. Adelfa López de Castro³, Dra. Yamilé Guardado Valdés⁴ y MSc. Dra. Reina Bermúdez Alemán⁵

1. Especialista de I Grado en Prótesis e Implantología. Hospital Universitario "Arnaldo Milián Castro". Profesora Auxiliar. UCM-VC.
2. Especialista de I Grado en Prótesis.
3. Especialista de II Grado en Prótesis. Máster en Educación Médica. Facultad de Estomatología. Profesora Auxiliar. UCM-VC.
4. Residente de Prótesis. UCM-VC.
5. Especialista de I Grado en Prótesis. Máster en Urgencias Estomatológicas. Instructora. UCM-VC.

Resumen

Se realizó un estudio descriptivo en el servicio de Prótesis, del Hospital Universitario "Arnaldo Milián Castro" de Santa Clara, Villa Clara, en el período de junio del 2003 a julio del 2004, para evaluar la satisfacción de la rehabilitación con sobredentaduras implantorretenidas mucosoportadas; se tomaron como criterios de inclusión: tener experiencia protésica anterior en maxilar o mandíbula, con tipo de anclaje de sistema de bola o sistema de barra-clip y tener como tiempo de rehabilitación entre 6 y 12 meses. Se estudiaron treinta pacientes rehabilitados, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 40 y 71 años de edad, a los que se aplicó una encuesta para recoger información sobre la experiencia protésica anterior: ajuste, masticación, fonética, estética y sentir psicológico, así como el uso de la prótesis. Posteriormente, se aplicó una segunda encuesta para evaluar la satisfacción con la rehabilitación mediante sobredentadura implantorretenida mucosoportada, y los pacientes fueron clasificados en tres categorías: satisfechos, medianamente satisfechos e insatisfechos, según los resultados de dicha evaluación. El mayor número de pacientes correspondió al grupo de 50 a 59 años y se observó predominio del sexo femenino; en el total de los casos, la experiencia protésica anterior fue insatisfactoria y, por último, según el área de ubicación, maxilar o mandibular, se encontraron en ambas arcadas dentarias. La rehabilitación con sobredentadura implantorretenida mucosoportada, al cabo de seis meses o más, se consideró satisfactoria (buena) en la mayoría de los casos. Según los pacientes, no se detectaron diferencias significativas de satisfacción según edad, sexo o localización de la sobredentadura, aunque esta última variable, a nuestro criterio, sí mostró diferencias significativas que sugieren que las dificultades se presentaron con mayor frecuencia en el maxilar. En la casi totalidad se encontró coincidencia de criterios. Para todos los aspectos estudiados, se obtuvieron mejoras apreciables; el sentir psicológico y el desempeño resultaron las causas que con más frecuencia se citaron como no totalmente satisfactorias.

Descriptores DeCS:

OSEOINTEGRACION
IMPLANTACION DENTAL
SATISFACCION DEL PACIENTE

Subject headings:

OSSEOINTEGRATION
DENTAL IMPLANTATION
PATIENT SATISFACTION